Table 2 Larvicidal activity of petroleum ether solvent extracts of *T. crispa* against 1^{st} – 4^{th} instars larvae of *Cx. quinquefasciatus*

Instar	Concentration (ppm)	Percentage mortality (Mean ± SE)		
		24 h	48 h	72 h
1^{st}	80	53.32 ± 0.33	66.68 ± 0.33	74.68 ± 0.33
	100	57.32 ± 0.33	69.32 ± 0.33	84.00 ± 0.58
	120	65.32 ± 0.33	76.00 ± 0.58	89.32 ± 0.33
	140	72.00 ± 0.58	84.00 ± 0.58	100.00 ± 0.00
	160	81.32 ± 0.33	94.68 ± 0.67	100.00 ± 0.00
2^{nd}	80	46.68 ± 0.33	58.68 ± 0.33	70.68 ±0.33
	100	53.32 ± 0.33	65.32 ± 0.33	78.68 ± 0.33
	120	58.68 ± 0.33	73.32 ± 0.33	84.00 ± 0.00
	140	69.32 ± 0.33	82.68 ± 0.33	96.00 ±0.58
	160	78.68 ± 0.67	89.32 ± 0.33	100.00 ± 0.00
3^{rd}	80	42.68 ± 0.33	56.00 ± 0.00	66.68 ± 0.33
	100	50.68 ± 0.33	62.68 ± 0.33	74.68 ± 0.33
	120	56.00 ± 0.58	68.00 ± 0.58	80.00 ± 0.58
	140	61.32 ± 0.33	73.32 ± 0.33	89.32 ± 0.33
	160	69.32 ± 0.33	82.68 ± 0.33	100.00 ± 0.00
4^{th}	80	34.68 ± 0.33	46.68 ± 0.33	58.68 ±0.33
	100	38.68 ± 0.33	49.32 ± 0.33	62.68 ± 0.33
	120	45.32 ± 0.33	57.32 ± 0.33	68.00 ± 0.58
	140	53.32 ± 0.33	65.32 ± 0.33	77.32 ± 0.33
	160	61.32 ± 0.33	69.32 ± 0.33	82.68 ±0.33